

INFORMATION OM ADENOTOMI

Adenoidektomi er fjernelse af "børnepolypper" / adenoide vegetationer, der findes i overgangen mellem næsehule og svælget (næsesvælget).

Ved besværet eller blokeret vejrtrækning gennem næsen, samt ved gentagne og langvarige mellemøreproblemer kan operativ fjernelse være påkrævet.

Operationen foregår i fuld bedøvelse, hvor børnepolypperne fjernes ved udskrabning gennem munden.

Fuld bedøvelse kræver overholdelse af faste regler/tom mavesæk. Man må senest have spist eller drukket mælkeprodukter indtil 6 timer før operationen, modermælk indtil 4 timer før og tynde væsker (vand, saft eller juice) indtil 2 timer før.

To timer før operationen gives smertestillende medicin i form af stikpille (panodil, pinex eller paracetamol) efter barnets vægt.

Operationen varer 10-15 minutter. Efterfølgende vil blødning fra næse og mundhulen forekomme. Barnet observeres i klinikken til tilstanden er stabil og blødningen ophørt.

Efter operationen kan drøblen midlertidigt føles mere fyldig og tungen øm. I starten anbefales blød kost som yoghurt, is o. lignende, stigende til franskbrød uden skorpe før overgang til normal kost.

Barnet bør være hjemme i mindst 2 døgn efter operationen. Ses frisk blødning fra halsen efter operationen, kontaktes klinikken (tlf. 70 400 900) eller lægevagten. Ved feber og/eller forværring af smerter i dagene efter operationen kontaktes klinikken (tlf. 70 400 900) eller egen læge.

Det anbefales at fortsætte med smertestillende medicin de første 1-2 døgn. Kontrol efter operation sker 1 måned efter indgrebet.