

INFORMATION OM OPERATION FOR STRITØRER

Ved operation for stritører laves en korrektion af en utilstrækkelig formning af øret.

Dette kan foregå i enten fuld eller lokal bedøvelse. Indgrebet tilstræber at genskabe den naturlige udformning af øret. Dette foretages ved et snit på øret bagside. Via en tunnel kan øret forside nås og den naturlige foldning skabes ved at slibe på ørebrusken.

Ved operation i fuld bedøvelse kræver overholdelse af faste regler/tom mavesæk. Man må senest have spist eller drukket mælkeprodukter indtil 6 timer før operationen og tynde væsker (vand, saft eller juice) indtil 2 timer før.

To timer før operationen gives smertestillende medicin i form af stikpille (panodil, pinex eller paracetamol) efter barnets vægt.

Operationen varer ca. 1½ time. Efterfølgende observeres barnet i klinikken til det er helt vågen.

Efter operationen anlægges en stritøreforbindinger, der fjernes i klinikken på 10. dagen efter indgrebet.

Ved smerter, feber eller gennemsivning af forbindingen kontaktes klinikken tlf. 70 400 900

Herefter skal man sove med nathue endnu i 3 uger. Tre måneder efter operationen kommer man til kontrol hos ørelægen.

Den første uge efter operationen anbefales sygemelding fra skole. Og først efter 2 uger kan almindelig fysisk aktivitet genoptages.