

## INFORMATION OM SEPTUMPLASTIK

En skæv næseskillevæg kan være årsag til nedsat eller ophævet vejtrækning gennem næsen. Denne skævhed kan korrigeres ved en septumplastik.

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 1 time. Indgrebet sker gennem en adgang inde i selve næsen – der bliver således ingen ar i huden. Efter korrektionen af næseskillevæggen holdes den på plads af en "næsetamponade"/gazetamponer i begge næsehuler.

Det vil ofte sivbløde lidt fra næsen det første døgn efter operationen og pga. næsetamponaden er man henvist til at trække vejret gennem munden og der kan komme trykken for ørerne. Sørg for at sove med hævet hovedgærde.

Dagen efter fjernes "næsetamponaderne" hos ørelægen og man instrueres i saltvandskyllning. Efter 1 uge påbegyndes brug af næsespray i én måned, hvorefter man kommer til kontrol.

Fuld bedøvelse kræver overholdelse af faste regler/tom mavesæk. Man må senest have spist eller drukket mælkeprodukter indtil 6 timer før operation og tynde væsker (vand, saft eller juice) indtil 2 timer før.

To timer før operationen gives smertestillende medicin (fortamol/kodipar).

Efter operationen observeres man i klinikken til man er helt vågen og tilstanden stabil. Man skal ledsages hjem og ikke opholde sig alene i første døgn efter indgrebet. Man skal forvente mindst én uges sygemelding. Ved frisk blødning fra næsen anbefales at man sutter på is. Ved vedvarende blødning, smerter eller feber kontaktes klinikken på tlf. 70 400 900